


Fig. 18. — Trichocéphale dispar, en haut le mâle, en bas la femelle. D'après Eichhorst (*grandeur naturelle*).

Image

Fig. 18. — Trichocéphale dispar, en haut le mâle, en bas la femelle. D'après Eichhorst (grandeur naturelle).

Informations

Extrait:	TRAITÉ PRATIQUE DES MALADIES DES PAYS CHAUDS. TOME TROISIÈME ET DERNIER. MALADIES DES SYSTÈMES LYMPHATIQUE ET CUTANÉ : PARASITES, ANIMAUX NUISIBLES (P. 532)
Provenances:	Bibliothèque Schœlcher
Type de contenu - document:	Image - Dessin, estampe, peinture
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

MALADIES

MÉDECINE TROPICALE

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

"Fig. 18. — Trichocéphale dispar, en haut le mâle, en bas la femelle. D'après Eichhorst (grandeur naturelle).", . Extrait de: *Traité pratique des maladies des pays chauds. Tome troisième et dernier, Maladies des systèmes lymphatique et cutané : parasites, animaux nuisibles*, , , p. 532. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 31 octobre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/SCH13268054OI1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés