




I. RAPHIA vinifera, II. MAURITIA flexuosa, III. vinifera, IV. aculeata, V. armata, VI. Martiana.
VII. LEPIDOCARYUM tenue, VIII. sexpartitum, IX. L. gracile, X. guainiense, XI. casiquiarensense.

62. I. RAPHIA vinifera, II. MAURITIA flexuosa, III. vinifera, IV. aculeata, V. armata, VI. Martiana. VII. LEPIDOCARYUM tenue, VIII. sexpartium, IX. L. gracile, X. guainiense, XI. casiquiareense.

[MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON \(1794-1868\)](#)

Description

I. Raphia II. Palmier-bâche ou Aguaje. Famille des Arecaceae, I. La fibre de raphia est utilisée pour tresser de nombreux objets. II. palmier de la famille Arecaceae aux fruits comestibles

Informations

Extrait:

[FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS. VOLUMEN III, PARS II, LEMNACEAE, ARACEAE, CYCLANTHACEAE, PALMAE \(APRÈS INDEX\)](#)

Provenances:

Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier

Type de contenu - document:

Image - Dessin, estampe, peinture

Base:

Bibliothèque numérique Manioc

Format:

image/jpeg

Mots clés

[FLORE](#)

[BRÉSIL](#)

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "62. I. RAPHIA vinifera, II. MAURITIA flexuosa, III. vinifera, IV. aculeata, V. armata, VI. Martiana. VII. LEPIDOCARYUM tenue, VIII. sexpartium, IX. L. gracile, X. guainiense, XI. casiquiareense.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen III, Pars II, Lemnaceae, Araceae, Cyclanthaceae, Palmae*, [BRÉSIL](#) , , après index. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 20 décembre 2025. Lien: [HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17061-043711](http://www.manioc.org/images/tls17061-043711).

© Manioc 2022 - Tous droits réservés