




Image

43. CUPHEA I. punctulata; II. ramosissima; III. arenarioides, IV. repens; V. mesostemon; IV. micrantha; VII. tenuissima; VIII. aperta.

[MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON \(1794-1868\)](#)

Description

Famille des Lythraceae

Informations

Extrait:

[FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS. VOLUMEN XIII. PARS II. CALLITRICHINEAE, VOCHYSLACEAE, TRIGONIACEAE, ONAGRACEAE, LYTHRACEAE, HALORAGEAE \(APRÈS INDEX\)](#)

Provenances:

Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier

Type de contenu - document:

Image - Dessin, estampe, peinture

Base:

Bibliothèque numérique Manioc

Format:

image/jpeg

Mots clés

[FLORE](#)

[BRÉSIL](#)

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "43. CUPHEA I. punctulata; II. ramosissima; III. arenarioides, IV. repens; V. mesostemon; IV. micrantha; VII. tenuissima; VIII. aperta.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen XIII, Pars II, Callitrichineae, Vochyslaceae, Trigoniceae, Onagraceae, Lythraceae, Halorageae, BRÉSIL* , , après index. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 21 septembre 2026. Lien: [HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17087-030311](http://www.manioc.org/images/tls17087-030311).

© Manioc 2022 - Tous droits réservés