


CUPHEA I. punctulata; II. ramosissima; III. arenarioides, IV. repens; V. mesostemon; VI. micrantha; VII. tenuissima; VIII. aperta.

Image

43. CUPHEA I. punctulata; II. ramosissima; III. arenarioides, IV. repens; V. mesostemon; IV. micrantha; VII. tenuissima; VIII. aperta.

MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON (1794-1868)

Description

Famille des Lythraceae

Informations

Extrait:	FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS DETECTARUM QUAS SUIS ALIORUMQUE BOTANICORUM STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE ILLUSTRATAS. VOLUMEN XIII, PARS II, CALLITRICHINEAE, VOCHYSLACEAE, TRIGONIACEAE, ONAGRACEAE, LYTHRACEAE, HALORAGEAE (APRÈS INDEX)
Provenances:	Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier
Type de contenu - document:	Image - Dessin, estampe, peinture
Base:	Bibliothèque numérique Manioc
Format:	image/jpeg

Mots clés

FLORE

BRÉSIL

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "43. CUPHEA I. punctulata; II. ramosissima; III. arenarioides, IV. repens; V. mesostemon; IV. micrantha; VII. tenuissima; VIII. aperta.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen XIII, Pars II, Callitrichineae, Vochyslaceae, Trigoniaceae, Onagraceae, Lythraceae, Halorageae*, BRÉSIL , , après index. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 15 novembre 2026. Lien: HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17087-0303I1.

© Manioc 2022 - Tous droits réservés